

MESSAGE TECHNIQUE 42-18

DESHERBAGE COLZA

Désherbage

Les désherbages à base de propyzamide (KERB FLO, BIWIX) peuvent être réalisés :

Problématique graminées résistantes : KERB FLO ou PROPYZ FLO 1,875 l/ha

Problématique graminées résistantes + rattrapage dicots (Matricaires, Coquelicots (y compris les Matricaires et les Coquelicots résistants aux sulfonilurées dans la rotation), Géranium, Bleuets, Pensée des champs, Fumeterre, Laiterons, Légumineuses) : **BIWIX 1,5 l/ha**

Problématique Sanve, capselle : CALLISTO 0,15 l/ha

Vous pouvez désormais réaliser vos pesées dans les colzas :

- 1 : Coupez les pieds de colza au ras du sol aux endroits les plus représentatifs dans la parcelle. Réaliser 2 à 3 prélèvements dans une même parcelle.
- 2 : Pesez : vous obtenez une valeur moyenne de poids frais sur la parcelle (en kg/m²)
- 3 : Réalisez la même chose à la sortie de l'hiver et consultez la réglette colza TERRES INOVIA.

Hivernage pulvérisateur


SDP HIVERTNAGE a une concentration de 40 %.

Ex : pour 100 l de bouillie, mettre 40 l de SDP HIVERTNAGE + 60 l d'eau

Assure une protection contre le gel, une lubrification des pièces, une protection contre la corrosion.

CEREALES :

Evolution des stades (en pourcentage des parcelles observées)



blé et
orge d'hiver
confondus

PUCERONS : Activité en diminution mais rester vigilant.

Continuer la surveillance des parcelles de façon à ne pas laisser une parcelle sans protection plus de 10 jours.



Seuil de nuisibilité : Jusqu'au stade début tallage : 10 % de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours quel que soit le niveau d'infestation.

Au seuil : **FURY 10 EW 0,15 l/ha ou TATAMI 0,125 l/ha
+ ACTEON 0,1 l/ha***


CICADELLES :

Captures de Cicadelles en diminution.

Seuil de nuisibilité : 30 captures par semaines sur plaques engluées.

Au seuil : **FURY 10 EW 0,15 l/ha ou
TATAMI 0,125 l/ha
+ ACTEON 0,1 l/ha***

Cicadelles : Orge d'hiver et blé confondus
présence sur piège



stade de sensibilité : dès la levée

seuil : 30 individus

■ nb parcelles n'ayant pas atteint le stade de sensibilité

■ nb parcelles INDEMNES

■ nb parcelles avec présence SOUS LE SEUIL DE NUISIBILITE

■ nb parcelles avec SEUIL DE NUISIBILITE ATTEINT ou DEPASSE

■ nb parcelles ayant dépassé le stade de sensibilité

Pensez à réserver vos semences de pois, féverole et orge de printemps

Féverole (ESPRESSO) : Densité de semis : 35 à 45 grains/m² en limon.

Pois (ASTRAUNOTE, SAFRAN) : densité : 85 grains/m² en limon à 100 grains/m² en craie.

Orge de printemps (PLANET, IRINA): 275 à 300 grains/m².

Plage de semis

25 sept. 1^{er} oct. 10 oct. 20 oct. 1^{er} nov. 20 nov. 1^{er} déc. 1^{er} janv.

Luminon,
Creek,



Cellule,
Armada



Filon



Jérôme PERRON / Laurent DUVAL

Pour les conditions de mise en œuvre, se référer aux bonnes pratiques phytosanitaires et respecter les exigences réglementaires définies dans l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code rural. Pour la composition des spécialités mentionnées dans le message, se référer au guide culture ASEL 2013-2014

S.A.S. au capital de 1 300 000 € - SIREN : 303.862.155 - R.C.S. Saint-Quentin 303.862.155

Agri service du Laonnais agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, N° PI 00006